

BEHANDELING ANEMIE BIJ CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE ANNO 2010

Carlo Gaillard, internist-nefroloog,
Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Marjolijn van Buren, internist-nefroloog,
Haga Ziekenhuis, Den Haag

Inhoud

- Stellingen /Toets
- Achtergrond/De Studies
- Stellingen/Discussie

STELLINGEN

- In alle stellingen gaat het om patiënten met CNI of dialyse (per stelling benoemd) en een anemie.
- Niet alle stellingen zijn evidence based. Geef het antwoord waar u het meest achter staat.
- ESA = erythropoetine stimulerende agent

Stelling 1

Behandeling met ESA's bij patiënten met CNI leidt tot afname LVH, en daardoor tot afname van cardiovasculaire mortaliteit

Juist
Onjuist

Stelling 2

Behandeling met ESA's bij patiënten met CNI leidt tot minder snelle progressie van CNI

Juist
Onjuist

Stelling 3

Behandeling met ESA's geeft een verbetering van QoL bij zowel pre-dialyse als dialyse patiënten

Juist
Onjuist

Stelling 4

Behandeling met ESA's leidt tot betere cognitieve functie

Juist
Onjuist

Stelling 5

De streefwaarde Hb bij dialysepatienten ligt lager dan bij pre-dialyse patiënten.

Juist
Onjuist

Stelling 6

Een Hb > 7.4 mmol/l is zowel bij dialysepatienten als bij pre-dialyse patiënten geassocieerd met een hogere cardiovasculaire mortaliteit

Juist
Onjuist

Stelling 7

ESA gebruik bij patienten met CNI vermindert de noodzaak tot cardiovasculaire revascularisatie

Juist
Onjuist

Stelling 8

Patienten met ESA resistentie kunnen beter af en toe een bloedtransfusie geven dan een continue hoge dosis ESA.

Juist
Onjuist

Stelling 9

Een Hb waarde > 7.4 mmol/l is bij pre-dialyse patiënten die met ESA worden behandeld geassocieerd met een hoger risico op CVA .

Juist
Onjuist

Stelling 10

Iedere patient die met ESA behandeld wordt dient ook ijzer suppletie te krijgen.

Juist
Onjuist

Stelling 11

Een Hb < 7.4 mmol/l is beter dan een Hb > 7.4 mmol/l, onafhankelijk van de ESA dosis die wordt gebruikt.

Juist
Onjuist

Stelling 12

Dialyse patienten met een bekende cardiovasculaire voorgeschiedenis zijn meer gebaat bij een Hb > 7.4 mmol/l dan patienten zonder CV voorgeschiedenis.

Juist
Onjuist

Stelling 13

Patienten met DM en CNI hebben lagere streefwaarden voor het Hb dan patienten zonder DM.

Juist
Onjuist